

## **LOS CHAQUENSES TÍPICOS “LOS CHOROTES”**

Por

DELFOR HORACIO CHIAPPE

La presente contribución al estudio de los “chaquenses típicos” ha sido realizada utilizando los datos obtenidos en ocasión del viaje efectuado durante los últimos días del mes de septiembre de 1967 a la zona N.E. de la provincia de Salta.

En dicha oportunidad y cumplimentando con lo estipulado en el convenio firmado entre la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y el Gobierno de la provincia de Salta, una comisión de estudio de la que formamos parte como encargados del aspecto bioantropológico, fue enviada por aquella casa de Altos Estudios, para realizar prospección, recolección de datos y el relevamiento biológico y cultural de algunos grupos indígenas que aún sobreviven en completo estado de aculturación.

Partiendo de la ciudad de Tartagal, hacia el N. E., tuvimos oportunidad de visitar algunos grupos de indígenas matacos y en especial chorotes.

El grueso de nuestras investigaciones, las realizamos en la localidad de La Merced a orillas del Río Pileomayo limítrofe con la República de Bolivia. Habitado en su mayoría por indígenas chorotes, conviven asimismo con algunos matacos, en especial en el paraje denominado La Merced Chica.

Las fotografías que ilustran el trabajo han sido gentilmente cedidas por la Srta. María Angélica Borrello, a quien mucho agradecemos la atención.

#### LOS CHOROTES

Lingüísticamente los chorotes se incluyen dentro de la familia denominada Mataco-Macá o Macan. La misma constituyó en épocas pasadas un sólido bloque que se extendía a través del Chaco casi desde las primeras elevaciones de los Andes, hasta el Río Piraguay, en especial sobre ambas márgenes de los ríos Pilcomayo y Bermejo hasta aproximadamente los 61° de long. W.

Junto a los chorotes deben agregarse como tribus más importantes a los matacos propiamente dichos, los Ashluslay y los Macá.

En la bibliografía etnográfica se los conoce también con la denominación de Tsolote, Solote, Zalota, Yofuaha, Manuk y Maniuk.

La designación de Chorotes y Zalota, aparecen por primera vez en Lozano (1941, p. 59-81) quien menciona 18 de sus parcialidades.

Aunque constituyendo un grupo bastante reducido en la actualidad, alcanzaron alrededor del año 1915 a la cantidad de 2.500 individuos, mitad de los cuales vivían en el Fortín Guachalla sobre el río Pilcomayo. El resto lo hacían sobre ambas márgenes del río Pilcomayo hasta Villamontes entre los 21°, 30° y 22° 30' de latitud sur y unas pocas familias vagaban a 10 o 15 leguas hacia adentro del río. En el año 1928 los asentamientos chorotes se hallaban cercanos a La Esmeralda, Guachalla y Galpón.

El grupo visitado por nosotros se halla cercano a la localidad de Santa Victoria (Prov. de Salta, Dep. de Rivadavia) en los parajes denominados La Merced Grande y La Merced Chica. En esta última conviviendo con matacos.

El de La Merced Grande se halla formado por aproximadamente 20 familias con un total de 85 individuos.

Al igual que casi todas las tribus actuales de los indígenas chaqueños presentan un avanzado estado de "lisis cultural". De esta manera mezclados a elementos propios de la cultura occidental, quedan todavía algunos de los bienes propios característicos de su estadio cultural. Evangelizados por misioneros protestantes, mezclan sus antiguos ritos a los propios característicos de su estadio cultural. Evangelizados por, los rezos que con texto pentecostal vierten a su lengua.

#### GENERALIDADES

El conjunto, somáticamente presenta, a primera vista, más acentuado y definido el tipo pampeano, poco evidente en otros grupos de chaqueños típicos, como lo hiciéramos notar oportunamente. Nacidos, criados y radicados en la zona durante toda su vida, no presentan (al menos basados en lo que pudimos averiguar) cruzamientos con blancos.

El estado de nutrición es bastante bueno. Las edades oscilan entre 70 y 10 años. Según pudimos observar, en general los caracteres seniles se hallan poco pronunciados y frecuentes; sólo en algunos individuos muy ancianos, se encuentra encanecimiento o encorvamiento.

En la parcialidad estudiada, existe un relativo equilibrio entre el número de mujeres-hombres (algunos ausentes en los ingenios) y el número de hijos de cada pareja oscila entre 1 y 4.

#### II. PARTE DESCRIPTIVA

A — *Caracteres externos.* 1 *Color del cutis.* Renovando la tan comprobada observación de la poca adaptabilidad de la tabla cromática (para piel) de Von Luschan para el cuadro americano; la pigmentación en todo el cuerpo en general, es

la pardoamarillenta propiamente dicha; siendo más intensa en el pecho y mejillas, en ambos sexos, y en la frente en las mujeres. Los sectores más pigmentados de toda la epidermis son el vientre y la espalda, no apareciendo (al menos en lo investigado por nosotros) el tinte pardorosado. Con respecto a la diferencia sexual de pigmentación, ésta es más intensa en la mujer que en el hombre.

2 — *Color del iris*. Sin excepción (en los casos observados) muy oscuro (negro humo de la caja de Martín) con la distribución de pigmentos cutáneos se halla más intensamente pigmentado en las mujeres.

3 — *Pelo*. El vello es nulo en la mayoría de los individuos estudiados, en los varones la barba es escasa o nula. En lo referente al cabello es, en general, grueso, liso y aplastado en las mujeres, mientras que, entre los varones, es a menudo (debido a su mayor grosor) rígido y erguido. La coloración es negra o pardo muy oscura.

## B. *Caracteres arquitectónicos*

### 1. *Estatura y proporciones del cuerpo*

B. *Caracteres arquitectónicos*. 1. *Estatura*. En conjunto las estaturas varían (según la clasificación de Topinard) entre las medianas y altas. La diferencia sexual, es como entre los Tobas de 10 em. en favor de los varones.

#### 2. *Proporciones corporales*, a) *Longitud relativa al tronco*

El índice skélico (Von Lushan) demuestra que la mayoría de los individuos poseen extremidades largas y troncos cortos (macroquélidos), la diferencia sexual es moderada.

### 3. *Miembros*

a) *Brazos*. Los valores obtenidos denotan un brazo corto en relación con la talla, en especial en las mujeres, existiendo una marcada diferencia sexual.

b) Miembro superior. Su longitud es proporcionada con respecto a la talla. La diferencia sexual es la corriente.

c) Miembro inferior. En general es considerablemente largo, siendo apreciablemente más largo con respecto al superior.

## 11. *Cefalometría*

1) *Cabeza*. Tanto en varones como en mujeres, la cabeza es considerablemente larga, con una diferencia sexual moderada. Con referencia a la relación longitudino-vertical, la mayoría son ipsicéfalos, es decir poseen una cabeza alta con respecto a su longitud, con diferencia sexual moderada. En lo que respecta a la relación transverso-vertical predomina la tapericocefalia, es decir cabeza baja con respecto a la anchura, la diferencia sexual es apreciable. En conjunto, puede generalizarse diciendo que los individuos estudiados poseen una altura mediana y una considerable anchura y longitud.

### 2) *Cara*.

a) *frente*: de anchura mediana, tanto individual como en relación con la anchura de la cabeza (índice fronto-parietal).

b) *anchura de la cara*: generalmente ancha con diferencia sexual moderada. Con referencia a su relación con la altura aurículo-vertex, es casi igual; en lo que respecta a la relación con el diámetro frontal mínimo indican una anchura moderada de la cara con respecto a la frente y viceversa.

c) *altura de la cara*: los valores obtenidos indican caras pronunciadamente largas, con diferencia sexual moderada; el índice facial los coloca dentro del grupo de los leptoprosopos. Con referencia al índice prosopico, las conformaciones corresponden a individuos leptomorfos.

3) *Mandíbulas*. Muy robustas y sumamente anchas.

4) *Nariz*. Considerablemente larga y ancha; el índice nasal los coloca entre los leptorrinos con diferencia sexual intensa a favor de las mujeres.

5) *Orbitas*. De anchura mediana; con respecto a la anchura de la cara poseen una anchura interorbitaria mediana.

### C. *Caracteres fisionómicos*

1. *Forma del tronco*: En conjunto, el tronco es corto y muy macizo. Sobre él se asienta un cuello musculoso (en los varones); con músculos pronunciados; a menudo ancho y corto.

El tórax es en la mayoría de los individuos, amplio, corto, ancho y profundo, robusto y muy bien proporcionado.

El abdomen, es sobre todo en los varones plano, corto y ancho. En todos los individuos examinados el pecho abundante y lleno. El pezón es mediano y la aureola saliente.

### 2. *Forma de las extremidades*:

Las manos, de anchura mediana, son generalmente largas, grandes, de dedos largos, bastante delgados. La mano de las mujeres, es en conjunto mucho más grácil.

Las uñas son grandes, largas, a menudo en forma de garra, muy abovedadas.

Los pies son grandes, de empeine a menor alto; no presentando como otros grupos observados por nosotros (tobas, matacos) separación del dedo grueso.

Tanto brazos como piernas, son en ambos sexos gráciles.

### 3. *Forma de la cabeza*

a) *Cabeza*. Por lo general, la frente es baja, sobre todo en las mujeres; la cabeza medianamente abovedada con tendencia a plana, la zona occipital, por lo general aplanada.

b) *Cara*. Generalmente grande, alta y ancha, sobre todo en los hombres; en los que tiene contorno sub-oval, mientras que entre las mujeres es sub-circular; las mejillas generalmente sobresalientes.

e) *Nariz*. Vista de frente es de contorno subtriangular sobre todo en los varones, mientras que en las mujeres es más baja y ancha. La raíz en ambos sexos de anchura mediana; el dorso ancho, de perfil ligeramente cóncava en las mujeres y algo convexa en los varones. Generalmente carnosas, de alas gruesas, de aberturas grandes, de forma sub-oval. Existe una marcada diferencia sexual.

*Boca*: Decididamente ancha, de labios muy gruesos, a menudo abultados, de mayor altura en las mujeres. Los dientes de tamaño muy grande, son rectos; presentan con mucha frecuencia, caries o faltan.

e) *Abertura palpebral*. Amplia, de forma sub-almendrada o fusiforme. En el grupo estudiado no apareció pliegue mogólico. El eje mayor es recto, sobre todo en los varones; en algunas mujeres hacia arriba y afuera.

f) *Oreja*. Presentan una diferencia sexual considerable; se ubican entre los individuos macro auriculares de anchura menor con respecto a la altura (índice auricular). Separadas de la cabeza en casi todos los individuos, de lóbulo grande.

#### D. Caracteres fisiológicos y bioquímicos

1) *Capacidad torácica*. De diferencia sexual moderada presentan un perímetro torácico considerable, demostrando poseer un tórax ampliamente desarrollado así como la posesión (índice de vitalidad) de una gran capacidad torácica con respecto a la estatura.

#### CONCLUSIONES

Tomando en cuenta la comparación de los caracteres métricos, a los que sumamos los exteriores, fisionómicos, fisiológicos y bioquímicos, corresponde a los charotes su inclusión dentro del grupo "Pámpido". De tal manera, son hombres de alta estatura, de cráneo dolicoide, voluminoso, el que con fre-

encia presenta un elevado espesor óseo y notable peso, de pómulos poderosos, mentón grueso y saliente, cara grande, nariz leptorrina. En general, la constitución del esqueleto es macisa, pero presentando una notable armonía. Del punto de vista biotipológico, podría incluirse, casi sin excepciones, dentro del corte muscular y atlético, con escaso dimorfismo sexual.

Debe aclararse, sin embargo que su estatura, es algo más reducida que la de los demás representantes del grupo. Tal discrepancia, se debería tal vez a la influencia ejercida por los tipos somáticos originarios de la Amazonia y del Altiplano brasileño.

En lo referente a su estadio cultural, debemos recordar aquí lo expresado en oportunidad de la presentación del material recogido en nuestras investigaciones entre los grupos matacos de la localidad de Laguna Yacaré (Prov. de Formosa), es decir el avanzado estado de "lisis cultural"; entre otros motivos por el desconocimiento de una correcta metodología adaptativa, así como del innegable y cada vez más arrollador avance de la cultura occidental.

#### SELECCION BIBLIOGRAFICA

- Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán de la Compañía de Jesús (1609-1637)*. Documentos para la Historia Argentina, vols. 19-20, Iglesia. 1927-29. Bs. Aires.
- GUEVARA, José. *Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán*. Av. Bibl. Nac. Bs. As. vol. 5-6. 1908-10.
- LOZANO, Pedro. *Descripción chorographica del terreno, ríos, árboles y animales de las dilatadísimas Provincias del Gran Chaco, Guayana. Y de los ritos y costumbres de las innumerables Naciones bárbaras e infieles, que las habitan...* Córdoba. 1733.
- Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán*. 5 vols. Bs. As. 1873-75.
- MÁRQUEZ MIRANDA, Fernando. *Hallazgos arqueológicos chaqueños*. Rel. Soc. Arg. Antrop.; vol. 3 pp. 7-27. 1942.



- SÁNCHEZ LARBADOR, Joseph. *Paraguay Catholico... Misión de los Indios Pampas... Puelches... Patagones...* 1772. Ed. C. Furlong C., *Los indios pampas-puelches-patagones*. Buenos Aires (Written 1772), 1936.
- SERRANO, Antonio. *Los primitivos habitantes del Territorio argentino*. Bs. As. 1930.
- TECCHO (DU TOICT, Nicolás del. *Historia provinciae Paraguariae Jesu Lcodü*, ex officina typog. J. M. Hovü. 1673.  
*Historia de la Provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús*. Madrid. 1897.

